

## Instrucciones importantes para el paciente

Tome sus pastillas exactamente como han sido prescritas (1 o 2 veces al día). Si no toma las pastillas no esté protegido.

No interrumpa el tratamiento si consultar a su médico.

No añada otras medicaciones sin consultar a su médico, incluso fármacos antiinflamatorios o antialgicos.

Avisé a su dentista, cirujano o otro médico antes de cualquier intervención.

## Medicación concomitante

Nombre:	Dosis:

## Información de urgencia

Las pruebas de coagulación no reflejan el nivel de anticoagulación!

Nombre y teléfono de un pariente a quien contactar en caso de urgencia:

  

Grupo sanguíneo del paciente (+ firma del médico):

# Fibrilación Auricular

## Tarjeta de Anticoagulantes

### Para anticoagulantes no-cumarínicos

Nombre del paciente: DOB:

Dirección del paciente:

Anticoagulante oral, dosis, hora de administración, con o sin comida:

Indicación de tratamiento:

Fecha de inicio del tratamiento:

Nombre y dirección del médico coordinar el tratamiento NOAC:

Número de teléfono del médico o en una clínica de coordinación:



Más información:  
[www.NOACforAF.eu](http://www.NOACforAF.eu)  
[www.noacforaf.eu](http://www.noacforaf.eu)

## Visitas: programadas o urgentes

## Seguimiento recomendado

(ver EHRA en [www.NOACforAF.eu](http://www.NOACforAF.eu) para información y consejo)

Revisar en cada visita:

1. Cumplimiento (el pac. Debe traer medicación sobrante)?
2. Eventos tromboembólicos?
3. Sangrados?
4. Otros efectos secundarios?
5. Otros medicamentos

**Análisis de sangre:**

- **No se precisa medir el nivel de anticoagulación!**
- **anualmente:** Hb, función renal y hepática
- **si CrCl 30-60 ml/min, edad >75 a, or fragilidad:** función renal cada 6 meses
- **si CrCl 15-30 ml/min:** función renal cada 3 meses
- **si ocurre algún evento que puede interferir:** función renal y/o hepática