Важни инструкции за пациента

Приемайте своето лекарство точно така, както е предписано (веднъж или два пъти дневно). Без прием на лекарството няма защита!
Никога не спирайте приемането на своето лекарство без да се посъветвате с Вашия лекар.
Никога, без да се посъветвате с Вашия лекар, не добавяйте каквото и да е друго лекарство, дори обезболяващ медикамент с кратко действие, който можете да закупите и без рецепта.
Уведомете за приема на Вашите медикаменти стоматолог, хирург или друг лекар, ако предстои интервенция.

Придружаващи медикаменти

Име:	Доза:

Информация в случай на спешност

Стандартните тестове не отразяват количествено нивото на антикоагулация!

Име и телефон за контакт на роднина на пациента при спешност:

Кръвна група на пациента (+ подпис на лекар):

Предсърдно мъждене

Карта за контрол при лечение с перорални антикоагуланти (без витамин К-антагонисти)

Име на пациента: **Дата на раждане:**

Адрес на пациента:

Перорален антикоагулант, доза, време за приемане, със или без храна:

Показание за лечение:

Начална дата на лечението:

Име и адрес на лекаря, който координира лечението с нов перорален антикоагулант:

Телефонен номер на лекаря-координатор или на клиниката:

EUROPEAN Heart Rhythm ASSOCIATION

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY®

More info:
www.NOACforAF.eu
www.noacforaf.eu

Планирани или извънредни прегледи

Дата:	Място (общо практикуващ лекар; клиника; кардиолог; ...):	Находки / препоръки:

Препоръчително проследяване

(вж. EHRA информация и практически съвети на **www.NOACforAF.eu**)

Провери при всеки преглед:

1. **Комплайанс (пациентът да носи медикаментите, които остават)?**
2. **Тромбо-емболични инциденти?**
3. **Инциденти с кървене?**
4. **Други странични ефекти?**
5. **Прием на други медикаменти, вкл. без рецепта**

Лабораторни изследвания:

- **не се изисква мониториране на нивото на антикоагулация!**
- **ежегодно:** хемоглобин, бъбречна и чернодробна функция
- **при CrCl 30-60 мл/мин., възраст над 75 г., физическа слабост:** контрол на бъбречна функция през 6 месеца
- **при CrCl 15-30 мл/мин:** контрол на бъбречна функция през 3 месеца
- **при интеркурентно заболяване, което може да окаже влияние:** бъбречна и/или чернодробна функция

Дата	Серумен креатинин	Креатининов клирънс	Хемоглобин	Черно-дробни тестове